

فصل ۳ درس ۳: اعمال جبری روی توابع

پیش‌نیازهای درس ۳:

- شناخت فرمول معادله خط از روی دو نقطه از نمودار
- انتقال عمودی و افقی نمودار توابعی با ضابطه $f(x) = x^r$ ، $f(x) = |x|$

اهداف درس ۳:

- آشنایی با چهار عمل اصلی روی نمایش جبری
- توابع (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
- رسم نمودار تابع با ضابطه های $g - f$ و $g + f$ با استفاده از نمودار f و g
- رسم نمودار تابع با ضابطه $y = kf(x)$ از روی $y = f(x)$ نمودار تابع با ضابطه



(کاردر کلاسی ۱۰۲ ص ۶۷)

و $f(x) = x^2 + 3x + 1$ ① برای دو تابع $g(x) = x - 3$ جدول داده شده‌ی زیر را کامل کنید.

تابع	ضابطه	دامنه
$f + g$		
$f - g$		
$f \times g$		
$\frac{f}{g}$		

برای دو تابع ② $v(x) = x - 1$ و $u(x) = \sqrt{x+1}$ جدول داده شده‌ی زیر را کامل کنید.

تابع	ضابطه	دامنه
$u + v$		
$u - v$		
$u \times v$		
$\frac{u}{v}$		

تمرين ۲: Homework

در هر مورد، دامنه و ضابطه حاصل جمع، ضرب، تقسیم و تفریق دو تابع داده شده را بیابید.

$$g(x) = \frac{1}{x} \text{ و } f(x) = |x| \quad \text{(الف)}$$

اعمال جبری روی تابع (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم):

اگر f, g به ترتیب دو تابع با دامنه‌های D_f, D_g باشند، در این صورت جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آنها را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

تابع	ضابطه	دامنه
$f + g$	$(f + g)(x)$	$D_f \cap D_g$
$f - g$	$(f - g)(x)$	$D_f \cap D_g$
$f \times g$	$(f \times g)(x)$	$D_f \cap D_g$
$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x)$	$D_f \cap D_g - \{x / g(x) = 0\}$

✓ نکته: همواره دامنه را قبل از ساده کردن ضابطه آن محاسبه می‌کنیم

✓ جمع و تفریق دو تابع خطی، تابعی خطی است

✓ ضرب دو تابع خطی، تابعی سهمی است

✓ تقسیم دو تابع خطی، تابعی گویا است

۱) اعمال جبری روی علشان جبری تابع:

(فعالیت ص ۶۵)

برای دو تابع $g(x) = x - 2$ و $f(x) = 2x - 1$ جدول داده شده‌ی زیر را کامل کنید. حل:

$$\begin{cases} D_f = R \\ D_g = R \end{cases} \longrightarrow R$$

تابع	ضابطه	دامنه
$f + g$	$2x - 1 + x - 2 = 3x - 3$	R
$f - g$	$2x - 1 - x + 2 = x + 1$	R
$f \times g$	$(2x - 1) \times (x + 2) = 2x^2 - 5x + 2$	R
$\frac{f}{g}$	$\frac{2x - 1}{x - 2}$ \downarrow $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$	$R - \{2\}$



$$\left. \begin{array}{l} D_f = \{0, 2, 3\} \\ D_g = \{0, 2, 3, -1\} \end{array} \right\} \longrightarrow \{0, 2, 3\}$$


ب) $g(x) = x + 2$ و $f(x) = x^3 - 4$

تابع	ضابطه	دامنه
$f + g$	$\left(0, \underbrace{-2+3}_{+1}\right), (2, 5+4), (3, 4+0)$	$\{0, 2, 3\}$
$f - g$	$\left(0, \underbrace{-2-3}_{-5}\right), (2, 5-4), (3, 4-0)$	$\{0, 2, 3\}$
$f \times g$	$(0, -2 \times 3), (2, 5 \times 4), (3, 4 \times 0)$	$\{0, 2, 3\}$
$\frac{f}{g}$	$\left(0, \frac{-2}{3}\right), (2, \frac{5}{4}), (3, \frac{4}{0})$	$\{0, 2\}$

۳) اعمال جبری روی نمودار توابع:

(فعالیت ص ۶۷)

مطابق شکل:



الف) ضابطه‌ی دو تابع f, g را به دست آورید: حل:

$$f(x) = 3x \quad g(x) = 2x$$

ب) ضابطه‌ی دو تابع $f - g$ و $f + g$ را به دست آورید و نمودار آنها رارسم کنید:

$$(f + g)(x) = 3x + 2x = 5x$$

$$(f - g)(x) = 3x - 2x = x$$

x	۰	۱
$f(x)$	۰	۳
$g(x)$	۰	۲
$(f+g)(x)$	۰	۵
$(f-g)(x)$	۰	۱

ت) $g(x) = x^3 + 3x - 10$ و $f(x) = \frac{x-2}{x+5}$

۲) اعمال جبری روی زوج مرتب توابع:

(تمرین ۲ ص ۶۹)

② دامنه و ضابطه حاصل جمع، ضرب، تقسیم و تفریق دو تابع داده شده را بیابید.

$$g = \{(-1, 2), (0, 3), (2, 4), (3, 0)\} \text{ و } f = \{(2, 5), (3, 4), (0, -2)\}$$

حل: ابتدا دامنه هر تابع سپس اشتراک آنها را نوشته و اعمال جبری را روی مولفه دوم (y) انجام می‌دهیم




(کاردرگلاس ۱ ص ۶۸)

① با توجه به نمودار تابع $y = f(x)$ در شکل ، نمودار تابع

② $y = -f(x)$ را رسم کنید. حل: عرض هر نقطه را قرینه یا در


۱- ضرب می کنیم.



x	۰	۴	-۳
$-f(x)$	-۱	۳	-۴

(کاردرگلاس ۲ ص ۶۹)

③ با توجه به شکل نمودار تابع با ضابطه $y = -2f(x)$ را رسم کنید. حل: عرض هر نقطه را در ۲- ضرب می کنیم



x	۰	۲	۴
$-2f(x)$	۰	-۴	-۴

(تعزیرین ۱ ص ۶۹)

① با استفاده از نمودار تابع زیر را رسم کنید.

(الف) $g(x) = -|x|$


(ب) $h(x) = -|x - 3|$

(پ) $l(x) = 2|x - 2|$

(تعزیرین ۲ ص ۶۹)

④ در شکل مقابل، نمودار دو تابع f ، g رسم شده است.


نمودار حاصل جمع این دو تابع را به دست آورید



(تعزیرین ۴ ص ۷۰)

⑤ با توجه به نمودار سه تابع داده شده، مشخص کنید کدام

یک از آنها برابر مجموع دو تابع دیگر است؟



حل:

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = ۱ \\ h(1) = -۲ \\ g(1) = -۱ \end{array} \right\} \rightarrow ۱ + (-۲) = -۱ \quad g(1)$$

رسم نمودار تابع با ضابطه $y = kf(x)$

از رسم تابع به کمک انتقال که در درس های قبلی گفته شده کمک می گیریم

- اگر k عددی مثبت باشد برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = kf(x)$ کافی است عرض هر نقطه از نمودار تابع با ضابطه $y = f(x)$ را k برابر کنیم.

(کاردرگلاس ۲ ص ۶۸)

برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = -f(x)$ کافی است

قرینه نمودار تابع با ضابطه $y = f(x)$ را نسبت به محور x

رسم کنیم به عبارتی عرض هر نقطه را قرینه یا در ۱- ضرب کنیم.



(تمرین ۳ ص ۶۹)

با استفاده از نمودار تابع زیر را
رسم کنید.

$$r(x) = \sqrt[2]{x}$$

$$s(x) = -\sqrt{x-2}$$

$$t(x) = -\sqrt[3]{x}$$

$$u(x) = 1 - \sqrt{x}$$

$$v(x) = 1 - \sqrt{x-3}$$