

بسم الله الرحمن الرحيم

درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

به طور کلی یک عبارت گویا، به کسری گفته می‌شود که صورت و مخرج آن چندجمله‌ای باشند.

• این عبارت‌ها گویا هستند.

$$\frac{-x^2}{2x+1}, \frac{-3}{\sqrt{y}}, \frac{x}{y}, \frac{a^2-b^2}{b+1}, \frac{5}{x+2}, \frac{1}{y}, \frac{\sqrt{3}}{x}, \frac{-3x}{\sqrt{5}}$$

$$\sqrt{ab}, \frac{x}{\sqrt{y}}, \frac{3}{\sqrt{xy-5}}$$

• این عبارت‌ها گویا نیستند:

زیرا $\sqrt{-5}$ و \sqrt{ab} طبق تعریف چندجمله‌ای نیستند.

 می‌دانیم کسرهای $\frac{7}{6}$ و $\frac{3}{0}$ نامعین (تعریف‌نشده) هستند، یعنی مقدار مشخصی ندارند. بنابراین یک عبارت گویا هنگامی تعریف‌شده است که مخرج آن مخالف صفر باشد. برای مثال عبارت $\frac{x}{x+1}$ یک عبارت گویا است که اگر به جای x هر عدد حقیقی قرار دهیم، مقدار آن مشخص است به جز عدد -1 ، زیرا مقدار عبارت به ازای $-1 = x$ می‌شود:

چون $\frac{1}{0}$ جواب مشخصی ندارد، بنابراین می‌گوییم عبارت $\frac{x}{x+1}$ به ازای $-1 = x$ تعریف نشده است، یا دامنه‌ی تعریف عبارت برابر است با:

$$D = \mathbb{R} - \{-1\}$$

بنابراین تعیین دامنه‌ی یک عبارت گویا، یعنی مشخص کردن مقادیری که به ازای آن‌ها عبارت گویا تعریف شده باشد.

برای تعیین دامنه‌ی یک عبارت گویا، باید مخرج کسر را مساوی صفر قرار دهیم و مقادیری که مخرج را مساوی صفر می‌کنند، مشخص کنیم و سپس آن‌ها از مجموعه‌ی اعداد حقیقی کم کنیم.

 دامنه‌ی تعریف هر یک از عبارت‌های گویای زیر را مشخص کنید.

$$\text{(الف)} \quad \frac{2x}{x^2-4}$$

$$\text{(ب)} \quad \frac{3x-1}{x+3}$$

$$\text{(ج)} \quad \frac{\sqrt{3}}{2x(x-\frac{1}{2})}$$

$$\text{(الف)} \quad x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-2=0 \Rightarrow x=2 \\ x+2=0 \Rightarrow x=-2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

یعنی در عبارت گویای مثال (الف) x هر عدد حقیقی می‌تواند باشد به جز -2 و 2 .

$$\text{(ب)} \quad x+3=0 \Rightarrow x=-3 \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{-3\}$$

$$\text{(ج)} \quad 2x(x-\frac{1}{2})=0 \Rightarrow \begin{cases} 2x=0 \Rightarrow x=0 \\ x-\frac{1}{2}=0 \Rightarrow x=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{0, \frac{1}{2}\}$$

 در تمامی مسائل مربوط به عبارت‌های گویا، مخرج عبارت مخالف صفر فرض می‌شود.

ساده‌ترین صورت می‌نویسیم.

دانلود از اپلیکیشن پادرس



مقدار عددی یک عبارت

 مقدار عددی عبارت $\frac{x-4}{2x+1}$ را به ازای $x=13$ حساب کنید.

$$\frac{x-4}{2x+1} = \frac{13-4}{2 \times 13 + 1} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$$

 ساده کردن عبارت های گویا: در کسرها، می توان صورت و مخرج کسر را در عددی مخالف صفر ضرب یا بر آن تقسیم کرد و با این عمل،
مقدار کسر تغییر نخواهد کرد.

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15} \Rightarrow \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{36}{48} = \frac{36 \div 12}{48 \div 12} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{36}{48} = \frac{3}{4}$$

چون عبارت های گویا به صورت کسر هستند، اگر عامل مشترکی به شکل ضرب در صورت و مخرج باشد، می توان آن را از صورت و مخرج حذف کرد و عبارت گویای ساده تری به دست آورد که با عبارت اولیه مساوی است. به این عمل ساده کردن عبارت گویا می گویند.

 عبارت های گویای زیر را ساده کنید.

(الف) $\frac{x^3 + 5x + 6}{x^3 - 4}$ =

(ب) $\frac{x^3 + 3x^2}{x^3 + 3x}$ =

(الف) $\frac{x^3 + 5x + 6}{x^3 - 4} = \frac{(x+2)(x+3)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x+3}{x-2}$

(ب) $\frac{x^3 + 3x^2}{x^3 + 3x} = \frac{x^2(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2}{x} = x$

درس دوم: محاسبات عبارت های گویا

 ضرب و تقسیم عبارت های گویا: ضرب و تقسیم عبارت های گویا مانند ضرب و تقسیم اعداد گویا است. فقط قبل از انجام عمل ضرب و تقسیم، در صورت امکان ابتدا کسرها را ساده می کنیم و سپس عمل ضرب و تقسیم را انجام می دهیم.

$$\frac{4}{8} \times \frac{6}{9} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{6}{9} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

 حاصل ضرب مقابله ای را انجام دهید.

(الف) $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} =$

(ب) $\frac{x^2y}{x^3y^3} \times \frac{y^2z^3}{yz^4} =$

(الف) $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

(ب) $\frac{x^2y}{x^3y^3} \times \frac{y^2z^3}{yz^4} = \frac{1}{x^2y^2} \times \frac{y^2z^3}{z^4} = \frac{1}{x^2y^2} \times \frac{z^3}{z^4} = \frac{1}{x^2yz}$

برای تقسیم عبارت های گویا نیز مانند تقسیم اعداد گویا، پس از ساده کردن کسرها، کسر اول را نوشته و تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و کسر دوم را معکوس می کنیم و یا از قاعده هی دور در دور استفاده می کنیم.



حاصل عبارت‌های زیر را حساب کنید.

$$\text{الف) } \frac{2}{3} \div \frac{5}{6} =$$

$$\text{ب) } \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{5}} =$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\text{ک) } \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{3}} = \frac{1 \times 5}{3 \times 4} = \frac{5}{12}$$



قاعده‌ی دور در دور

حاصل عبارت‌های زیر را حساب کنید.

$$\text{الف) } \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} =$$

$$\text{ب) } \frac{\frac{6x^3}{8y^3}}{\frac{-2x^3}{12y^3z}} =$$

$$\text{الف) } \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$\text{ب) } \frac{\frac{6x^3}{8y^3}}{\frac{-2x^3}{12y^3z}} = \frac{6x^3 \times 12y^3z}{8y^3 \times (-2x^3)} = \frac{3x^2 \times 4y^2 z}{-2y^2 \times x^2} = \frac{-9z}{2xy}$$



جمع و تفریق عبارت‌های گویا

جمع و تفریق عبارت‌های گویا، مانند جمع و تفریق اعداد گویا است، یعنی پس از ساده‌کردن کسرها در صورت امکان، کسرها را هم‌خرج کرده و سپس عمل جمع یا تفریق را انجام می‌دهیم.

حاصل عبارت‌های زیر را حساب کنید.

$$\text{الف) } \frac{2}{3} + \frac{4}{5} =$$

$$\text{ب) } \frac{3}{4} - \frac{1}{3} =$$

$$\text{ج) } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} =$$

$$\text{د) } a - \frac{b}{c} =$$



$$\text{الف) } \frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15}$$

$$\text{ب) } \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$$

$$\text{ج) } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\text{د) } a - \frac{b}{c} = \frac{a}{1} - \frac{b}{c} = \frac{ac}{c} - \frac{b}{c} = \frac{ac - b}{c}$$

ساده‌کردن عبارت‌های مرکب: کسری که صورت و مخرج آن عبارت‌های گویا باشند، آن کسر را عبارت گویای مرکب می‌نامند. برای

محاسبه‌ی حاصل یک عبارت مرکب، صورت و مخرج را جداگانه ساده می‌کنیم و سپس حاصل صورت را بر حاصل مخرج تقسیم می‌کنیم.

$$\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{\frac{a+b}{b} + \frac{a+b}{a}} =$$

حاصل عبارت مرکب مقابل را حساب کنید.

دانلود از اپلیکیشن پادرس



 ثابت کنید که اگر متحرکی مسافت x متر را با سرعت ثابت v_1 برود و همین مسافت را با سرعت ثابت v_2 برگردد، سرعت متوسط آن برابر

$$\frac{x}{v_1} \text{ زمان برگشت}$$

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

 می‌دانیم که $\bar{v} = \frac{x}{t}$ بنابراین:

$$\bar{v} = \frac{2x}{t_1 + t_2} = \frac{2x}{\frac{x}{v_1} + \frac{x}{v_2}} = \frac{2x}{\frac{x(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2x}{\frac{2x(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

درس سوم: تقسیم چندجمله‌ای

تقسیم یک جمله‌ای بر یک جمله‌ای

برای تقسیم دو یک جمله‌ای بر یکدیگر از قوانین ساده کردن کسرها و قوانین مربوط به ساده کردن جمله‌های توان دار استفاده می‌کنیم.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a \neq 0)$$

 حاصل تقسیم‌های زیر را حساب کنید.

$$(الف) \frac{-24x^3y^2z}{6xy^3z} =$$

$$(ب) \frac{-68a^3b^3c^4}{-17ab^2c^3} =$$

$$(الف) \frac{-24x^3y^2z}{6xy^3z} = -\frac{\cancel{2}^x \cancel{4}^x \cancel{y}^2 \cancel{z}^z}{\cancel{6}^y \cancel{x}^x \cancel{y}^3 \cancel{z}^z} = -\frac{4x^2}{y}$$

$$(ب) \frac{-68a^3b^3c^4}{-17ab^2c^3} = +\frac{\cancel{6}^a \cancel{8}^b \cancel{a}^b \cancel{b}^c \cancel{c}^4}{\cancel{17}^a \cancel{a}^b \cancel{b}^c \cancel{c}^3} = 4abc$$

تقسیم چندجمله‌ای بر یک جمله‌ای

به مثال زیر توجه کنید.

$$\frac{4+2}{4} = \frac{4}{4} + \frac{2}{4} = 1 + \frac{1}{2}$$

 به این قاعده، قاعده‌ی تفکیک یا جدا کردن می‌گویند.

برای تقسیم چندجمله‌ای بر یک جمله‌ای، می‌توان از قاعده‌ی بالا استفاده کرد.

$$\frac{18a^3 - 24a^2 + 12a}{3a} =$$

 حاصل تقسیم مقابله را به ساده‌ترین صورت بنویسید.

$$\frac{18a^3 - 24a^2 + 12a}{3a} = \frac{\cancel{18}^6 a^3}{\cancel{3}^1 a} - \frac{\cancel{24}^8 a^2}{\cancel{3}^1 a} + \frac{\cancel{12}^4 a}{\cancel{3}^1 a} = 6a^2 - 8a + 4$$



مقسوم	مقسوم علیه
خارج قسمت	
باقی مانده	

اگر تقسیمی درست انجام شده باشد، باید رابطه‌های زیر، برای آن تقسیم درست باشد.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{مقسوم علیه} > \text{باقی مانده: رابطه (۱)} \\ \text{مقسوم} = \text{باقی مانده} + \text{مقسوم علیه} \times \text{خارج قسمت: رابطه (۲)} \end{array} \right.$$

اگر باقی مانده‌ی تقسیم صفر باشد، می‌گوییم مقسوم بر مقسوم علیه، بخش‌پذیر است.

در تقسیم چندجمله‌ای بر چندجمله‌ای باید به ۲ نکته دقت کنیم:

۱- قبل از انجام عمل تقسیم، مقسوم و مقسوم علیه بر حسب توان‌های نزولی متغیر مرتب شده باشند.

۲- تقسیم را تا جایی باید ادامه دهیم که، یا باقی مانده صفر شود و یا درجه‌ی باقی مانده از درجه‌ی مقسوم علیه کم‌تر باشد.

اکنون با یک مثال، تقسیم چندجمله‌ای بر چندجمله‌ای را توضیح می‌دهیم.

حاصل تقسیم چندجمله‌ای $x^3 + 4x^2 + 2x -$ را بر چندجمله‌ای $x -$ حساب کنید و باقی مانده را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} -x^3 + 2x^2 + 4x \\ \hline 1-x \end{array}$$

در مرحله‌ی اول، مقسوم و مقسوم علیه را بر حسب توان‌های نزولی x مرتب می‌کنیم.

$$\begin{array}{r} 2x^3 - x^2 + x + 4 \\ \hline -x + 1 \end{array}$$

سپس اولین جمله‌ی مقسوم را بر اولین جمله‌ی مقسوم علیه تقسیم می‌کنیم:

$$\begin{array}{r} 2x^3 \\ -x \\ \hline -2x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + x + 4 \\ \pm 2x^4 \mp 2x^2 \\ \hline x^2 + x + 4 \\ -x^2 \mp x \\ \hline 2x + 4 \\ -2x \mp 2 \\ \hline \text{باقی مانده} \rightarrow 6 \end{array}$$

خارج قسمت به دست آمده (جمله‌ی $-2x^2$) را در مقسوم علیه $(-x+1)$ ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب را زیر مقسوم می‌نویسیم. چون عبارت به دست آمده را باید از مقسوم کم کنیم، بنابراین علامت جمله‌های آن را قرینه می‌کنیم.

اکنون چندجمله‌ای باقی مانند مرحله‌ی قبل بر مقسوم علیه، تقسیم می‌کنیم و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا عمل تقسیم پایان یابد.

